

Cómo detectar y actuar en un ictus en tiempos de COVID

La infección provocada por SARS-CoV-2 (COVID-19) puede incrementar el riesgo de ictus

CÓMO DETECTARLO

Pídele que sonría. Su boca estará torcida.



Pídele que repita alguna palabra.



Pídele que levante los brazos.




Otros síntomas: pérdida de visión, sensación de vértigo, dolor de cabeza intenso.

Pídele que se levante y se siente.



QUÉ ES


Es una enfermedad cerebrovascular aguda que se produce cuando una arteria del cerebro se cierra bruscamente (ictus isquémico **1**) o porque la arteria se rompe (ictus hemorrágico, **2** también conocido como derrame cerebral).




1



2



CÓMO PREVENIRLO




VIGILA HIPERTENSIÓN




CONTROLA DIABETES



NO FUMES



HAZ VIDA SANA



CUMPLETRATAMIENTOS



NO BEBAS ALCOHOL

CÓMO ACTUAR

- Busca asistencia sanitaria urgente.
- No esperes. Las primeras 3-6 horas son vitales.
- Ante sospecha de COVID-19 avisa al pedir asistencia sanitaria.
- No tengas miedo a ir a urgencias o revisiones.
- **Detectar sus síntomas y actuar con rapidez salva vidas y reduce las consecuencias de un ictus.**

